



アレルギー性疾患治療剤

# アレギサル®ドライシロップ 0.5%

## 1日投与量体重別早見表

### 【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」の項参照）
- (2) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

### ●気管支喘息●

#### アレギサルドライシロップ0.5%の用法・用量

通常，小児にはペミロラステカリウムとして**1回0.2mg/kgを1日2回**，朝食後及び就寝前に，用時溶解して経口投与する。

なお，年齢，症状により適宜増減する。

年齢別の標準投与量は，通常，下記の用量を1回量とし，1日2回朝食後及び就寝前に，用時溶解して経口投与する。

年齢	1回投与量	1日投与量
1歳以上5歳未満	0.5g(ペミロラステカリウムとして 2.5mg)	1.0g(ペミロラステカリウムとして 5.0mg)
5歳以上11歳未満	1.0g(ペミロラステカリウムとして 5.0mg)	2.0g(ペミロラステカリウムとして 10.0mg)
11歳以上	2.0g(ペミロラステカリウムとして 10.0mg)	4.0g(ペミロラステカリウムとして 20.0mg)

体重	1日投与量(分2)	
	ドライシロップとして	ペミロラステカリウムとして
8 kg	0.64 g/day	3.2 mg/day
9 kg	0.72 g/day	3.6 mg/day
10 kg	0.80 g/day	4.0 mg/day
11 kg	0.88 g/day	4.4 mg/day
12 kg	0.96 g/day	4.8 mg/day
13 kg	1.04 g/day	5.2 mg/day
14 kg	1.12 g/day	5.6 mg/day
15 kg	1.20 g/day	6.0 mg/day
16 kg	1.28 g/day	6.4 mg/day
17 kg	1.36 g/day	6.8 mg/day
18 kg	1.44 g/day	7.2 mg/day
19 kg	1.52 g/day	7.6 mg/day
20 kg	1.60 g/day	8.0 mg/day
21 kg	1.68 g/day	8.4 mg/day
22 kg	1.76 g/day	8.8 mg/day
23 kg	1.84 g/day	9.2 mg/day
24 kg	1.92 g/day	9.6 mg/day
25 kg	2.00 g/day	10.0 mg/day
26 kg	2.08 g/day	10.4 mg/day
27 kg	2.16 g/day	10.8 mg/day
28 kg	2.24 g/day	11.2 mg/day
29 kg	2.32 g/day	11.6 mg/day
30 kg	2.40 g/day	12.0 mg/day
31 kg	2.48 g/day	12.4 mg/day
32 kg	2.56 g/day	12.8 mg/day
33 kg	2.64 g/day	13.2 mg/day
34 kg	2.72 g/day	13.6 mg/day
35 kg	2.80 g/day	14.0 mg/day
36 kg	2.88 g/day	14.4 mg/day
37 kg	2.96 g/day	14.8 mg/day
38 kg	3.04 g/day	15.2 mg/day
39 kg	3.12 g/day	15.6 mg/day
40 kg	3.20 g/day	16.0 mg/day

### ●アレルギー性鼻炎●

#### アレギサルドライシロップ0.5%の用法・用量

通常，小児にはペミロラステカリウムとして**1回0.1mg/kgを1日2回**，朝食後及び就寝前に，用時溶解して経口投与する。

なお，年齢，症状により適宜増減する。

年齢別の標準投与量は，通常，下記の用量を1回量とし，1日2回朝食後及び就寝前に，用時溶解して経口投与する。

年齢	1回投与量	1日投与量
1歳以上5歳未満	0.25g(ペミロラステカリウムとして 1.25mg)	0.5g(ペミロラステカリウムとして 2.5mg)
5歳以上11歳未満	0.5g(ペミロラステカリウムとして 2.5mg)	1.0g(ペミロラステカリウムとして 5.0mg)
11歳以上	1.0g(ペミロラステカリウムとして 5.0mg)	2.0g(ペミロラステカリウムとして 10.0mg)

体重	1日投与量(分2)	
	ドライシロップとして	ペミロラステカリウムとして
8 kg	0.32 g/day	1.6 mg/day
9 kg	0.36 g/day	1.8 mg/day
10 kg	0.40 g/day	2.0 mg/day
11 kg	0.44 g/day	2.2 mg/day
12 kg	0.48 g/day	2.4 mg/day
13 kg	0.52 g/day	2.6 mg/day
14 kg	0.56 g/day	2.8 mg/day
15 kg	0.60 g/day	3.0 mg/day
16 kg	0.64 g/day	3.2 mg/day
17 kg	0.68 g/day	3.4 mg/day
18 kg	0.72 g/day	3.6 mg/day
19 kg	0.76 g/day	3.8 mg/day
20 kg	0.80 g/day	4.0 mg/day
21 kg	0.84 g/day	4.2 mg/day
22 kg	0.88 g/day	4.4 mg/day
23 kg	0.92 g/day	4.6 mg/day
24 kg	0.96 g/day	4.8 mg/day
25 kg	1.00 g/day	5.0 mg/day
26 kg	1.04 g/day	5.2 mg/day
27 kg	1.08 g/day	5.4 mg/day
28 kg	1.12 g/day	5.6 mg/day
29 kg	1.16 g/day	5.8 mg/day
30 kg	1.20 g/day	6.0 mg/day
31 kg	1.24 g/day	6.2 mg/day
32 kg	1.28 g/day	6.4 mg/day
33 kg	1.32 g/day	6.6 mg/day
34 kg	1.36 g/day	6.8 mg/day
35 kg	1.40 g/day	7.0 mg/day
36 kg	1.44 g/day	7.2 mg/day
37 kg	1.48 g/day	7.4 mg/day
38 kg	1.52 g/day	7.6 mg/day
39 kg	1.56 g/day	7.8 mg/day
40 kg	1.60 g/day	8.0 mg/day

■【効能・効果】【用法・用量】【禁忌を含む使用上の注意】等については，最新の添付文書をご参照ください。

製造販売

ニプロESファーマ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

2ALG-303B-  
2017年11月作成