

アジスロマイシン細粒 10%小児用「KN」

このお薬を服用される方へ

このお薬は**抗生物質**です。

- 1日1回3日間続けて服用してください。



- このお薬の**重複投与を避けるため**、他の医療機関で診療を受ける方は、アジスロマイシン細粒 10%小児用「KN」を服用していた事を医師に伝えてください。

このお薬と一緒に飲んではいけないお薬や、一緒に飲むときには医師の指導が必要なお薬があります。現在、他のお薬を飲んでいる場合は、必ず医師にお申し出ください。



- 投与開始から4日目以降でも症状の改善がみられない場合、不快な症状がみられた場合、またこのお薬について、わからないことがある場合には、医師または薬剤師に相談してください。

アジスロマイシン細粒 10% 小児用「KN」

このお薬を服用される方へ

このお薬はだいたい色の細粒です。
甘みを加えたオレンジサイダー風味です。

- **飲み方** 少量の水(5~10mL)にまぜて、飲んでも良いです。
十分な水を飲ませてください。お薬が口に残ると苦味が残ります。
- **飲みやすくする工夫**



一緒に飲んでも苦味が出にくいもの

お水では飲みにくいお子様に、次のような飲み物・食べ物
に混ぜてあげてください。



牛乳(コーヒー牛乳)



紅茶



ウーロン茶



ココア



バニラアイスクリーム

プリン

- 作り置きはせず、お薬を飲ませる直前に混ぜてください。
混ぜ過ぎると苦味が出てきます。



一緒に飲むと苦味が出やすいもの



アップルジュース



オレンジジュース



スポーツドリンク



乳酸飲料



ヨーグルト