

●飲みやすくする工夫



一緒に飲んでも苦味が出にくいもの
お水では飲みにくいお子様に、次のような
飲み物・食べ物に混ぜてあげてください。



牛乳(コーヒー牛乳) ウーロン茶 パニライスクリーム

■作り置きはせず、お薬を飲ませる直前に混ぜてください。
混ぜ過ぎると苦味が出てきます。



一緒に飲むと苦味が出やすいもの



アップルジュース オレンジジュース スポーツドリンク 乳酸飲料 ヨーグルト

●このお薬の**重複投与**を避けるため、他の医療
機関で診療を受ける方は、アジスロマイシン
細粒 10%小児用「KN」を服用していた事を
医師に伝えてください。

このお薬と一緒に飲んではいけないお薬や、一緒に
飲むときには医師の指導が必要なお薬があります。
現在、他のお薬を飲んでる場合は、必ず医師にお
申し出ください。



●投与開始から4日目以降でも症状の改善が
みられない場合、不快な症状がみられた場
合、またこのお薬について、わからないこと
がある場合には、医師または薬剤師に相談し
てください。

ニプロESファーマ株式会社

2AZTH307F- 2020年1月作成 1912270166


アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」

このお薬を正しく
服用していただくために



このお薬は**抗生物質**です。

●1日1回3日間続けて服用してください。



3日

2日

1日

1日1回3日間
服用してください

日 目

飲みはじめた日