



閉塞性気道疾患用剤

# ベラチンドライシロップ<sup>®</sup>小児用0.1%

## 1日投与量体重別早見表

**【禁忌】**（次の患者には投与しないこと）  
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

### ベラチンドライシロップ小児用0.1%の用法・用量

通常、小児に対し、ドライシロップとして、**1日40mg/kg（ツロブテロール塩酸塩として0.04mg/kg）を2回に分け**、用時溶解して経口投与する。  
ただし、年齢、症状により適宜増減する。なお、標準投与量は、通常、下記の用量を1日2回に分け、用時溶解して経口投与する。

年齢	ドライシロップとして1日量 (ツロブテロール塩酸塩として1日量)
0.5～3歳未満	0.25～0.5g (0.25～0.5mg)
3～9歳未満	0.5～1g (0.5～1mg)
9～15歳	1～2g (1～2mg)

体重	1日投与量(分2)	
	ドライシロップとして	ツロブテロール塩酸塩として
8 kg	0.32 g/day	0.32 mg/day
9 kg	0.36 g/day	0.36 mg/day
10 kg	0.40 g/day	0.40 mg/day
11 kg	0.44 g/day	0.44 mg/day
12 kg	0.48 g/day	0.48 mg/day
13 kg	0.52 g/day	0.52 mg/day
14 kg	0.56 g/day	0.56 mg/day
15 kg	0.60 g/day	0.60 mg/day
16 kg	0.64 g/day	0.64 mg/day
17 kg	0.68 g/day	0.68 mg/day
18 kg	0.72 g/day	0.72 mg/day
19 kg	0.76 g/day	0.76 mg/day
20 kg	0.80 g/day	0.80 mg/day
21 kg	0.84 g/day	0.84 mg/day
22 kg	0.88 g/day	0.88 mg/day
23 kg	0.92 g/day	0.92 mg/day
24 kg	0.96 g/day	0.96 mg/day
25 kg	1.00 g/day	1.00 mg/day

体重	1日投与量(分2)	
	ドライシロップとして	ツロブテロール塩酸塩として
26 kg	1.04 g/day	1.04 mg/day
27 kg	1.08 g/day	1.08 mg/day
28 kg	1.12 g/day	1.12 mg/day
29 kg	1.16 g/day	1.16 mg/day
30 kg	1.20 g/day	1.20 mg/day
31 kg	1.24 g/day	1.24 mg/day
32 kg	1.28 g/day	1.28 mg/day
33 kg	1.32 g/day	1.32 mg/day
34 kg	1.36 g/day	1.36 mg/day
35 kg	1.40 g/day	1.40 mg/day
36 kg	1.44 g/day	1.44 mg/day
37 kg	1.48 g/day	1.48 mg/day
38 kg	1.52 g/day	1.52 mg/day
39 kg	1.56 g/day	1.56 mg/day
40 kg	1.60 g/day	1.60 mg/day
41 kg	1.64 g/day	1.64 mg/day
42 kg	1.68 g/day	1.68 mg/day
43 kg	1.72 g/day	1.72 mg/day
44 kg	1.76 g/day	1.76 mg/day
45 kg	1.80 g/day	1.80 mg/day
46 kg	1.84 g/day	1.84 mg/day
47 kg	1.88 g/day	1.88 mg/day
48 kg	1.92 g/day	1.92 mg/day
49 kg	1.96 g/day	1.96 mg/day
50 kg	2.00 g/day	2.00 mg/day

■【効能・効果】【用法・用量】【禁忌を含む使用上の注意】等については、最新の添付文書をご参照ください。