

ドネペジル塩酸塩内用液「タナベ」

～服用にあたって注意いただくこと～

内用液3mg



内用液5mg



内用液10mg



① 1日1回お飲みください。

② お薬の量は主治医の指示に従ってください。

1日3mgから開始し、1～2週間後に1日5mgになります。

(お薬の量を少しから始めるのは、お薬を体に徐々に慣れさせていくためです。)

その後、症状の進行に合わせて1日10mgになります。

③ 飲み忘れても2日分を一度に飲まないでください。

④ お薬の服用を、**ご自身やご家族の判断で中止しない**でください。

服薬チェックシール

薬の飲み忘れないかをチェックするためのものです。服用後、1枚ずつカレンダーに貼ってお使いください。

※チェックシールをご希望の場合は、医療機関へお問い合わせください。




吉富薬品株式会社 ニプロESファーマ株式会社

このお薬は「飲みぐすり」です。梅風味です


開け方

図のように「押さえる」の表示部分を持って切り口から開けてください。

*ほかの部分を持って開けると中身が飛び出ることがあります。



飲み方



●スプーンやカップに
移して飲む場合

●直接、切り口から飲む場合
切り口で口内を傷つけない
よう注意してください。

*飲みづらい場合は、少量の水などと混ぜて飲むこともできます。

ごえん

誤嚥(飲食物や薬が気管に入り、むせる)を防ぐために…

この薬を飲むときは、寝たままの状態で飲まないように、体を起こしてください。
起き上がることが困難な場合は、少し上体を起こしてお飲みください。

飲みやすくする工夫

● 混ぜてもよいもの

白がゆ、味噌汁、麦茶、水、スポーツ飲料、オレンジジュース、りんごジュース、牛乳、
バニラのアイスクリーム、野菜ジュース、コーヒー、プリン、ヨーグルト等



● 混ぜるのがすすめられないもの

茶葉成分が入っているお茶（緑茶、紅茶、ウーロン茶）



- 1 開封後はすみやかに全量を服用してください。
- 2 子供の手の届かない所に保管してください。
- 3 目・鼻・耳に使用しないでください。