


患者さんへ

ジドレンテープ[®]27mg (DYDRENE TAPE 27mg) の使い方

このテープは狭心症の薬です。医師の指示に従って、正しく使用してください。

貼る場所

胸、腰、上腕のいずれかに貼ってください。
貼る場所が汗・脂等でぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。




必ず上の図のいずれかの場所に貼ってください

- 自動体外式除細動器 (AED) の電極パッドの貼付部位は「右鎖骨すぐ下」と「左脇下の肋骨最下部」です。
本剤を貼る際は、AEDの妨げとならないよう、必ず上の図の場所に貼ってください。

裏面もお読みください

貼り方



- ① 四角の透明シールにスリットを入れてありますので、それを上にして二つに折ってください。
- ② シールの一方をはがして、テープの粘着面を皮膚に貼り付けてください。
- ③ もう一方のシールも同様にはがし、皮膚に貼ってください。（テープにしわが寄らないように十分注意して貼ってください。）

その他の注意

- 傷口、発赤、発疹、かぶれ等のある場所及び胸毛の部分には貼らないでください。
- 新しい薬に貼り替えるときは、前回と異なる場所に貼ってください。
- 薬を貼っているときには勃起不全治療剤（バイアグラ錠、レビトラ錠、シアリス錠など）や、レバチオ錠、アドシルカ錠、ザルティア錠、アデムパス錠などは絶対に服用しないでください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- ご使用になるまでは、開封しないで、高温を避けて保管してください。