

硝酸薬（類薬を含む） を使用されている方へ

この薬の注意点

- この薬は、狭心症など心臓の疾患に使われます。
この薬を使用中及び使用後は以下の薬を絶対に
使用しないでください。
 - ・シルデナフィルクエン酸塩（バイアグラ®錠など）
 - ・バルデナフィル塩酸塩水和物（レビトラ®錠など）
 - ・タダラフィル（シアリス®錠など）
 - ・リオシグアト（アテムパス®錠など）
- この薬を急に中断すると症状が悪化することがあります。自分で判断して使用するのを止めたりせずに、医師の指示通りに使用してください。

この他の薬でも併用によって副作用が生じることがありますので、現在使用している薬がある方は、医師または薬剤師に必ずお伝えください。

他の診療科や病院・医院を受診される場合は、現在使用しているすべての薬についてお伝えください。

（裏面もお読みください）

他の診療科または病院・医院を受診する際に先生にお見せください

医師、薬剤師の先生方へ

この患者さんは、硝酸薬(一硝酸イソソルビド錠[トーフ]、硝酸イソソルビド徐放錠[トーフ]、ジドレンテープ)、類薬(ニコランジル錠[トーフ])を使用中です。次の薬剤との併用によって致命的な血圧低下に至った例が報告されており、併用禁忌ですのでご注意ください。

- シルденаフィルクエン酸塩
- バルденаフィル塩酸塩水和物
- タダラフィル
- リオシグアト

この他併用に注意する薬剤がありますので、本剤の添付文書をご覧ください。

施設名



東和薬品株式会社