

服用にあたって

プラバスタチンNa塩錠「タナベ」を服用される
患者様へお渡し下さい。

HMG-CoA還元酵素阻害剤—高脂血症治療剤—

日本薬局方 プラバスタチンナトリウム錠

プラバスタチンNa塩錠 5mg「タナベ」

プラバスタチンNa塩錠 10mg「タナベ」

PRAVASTATIN SODIUM Tablets 5mg・Tablets 10mg

プラバスタチンNa塩錠「タナベ」を服用される患者様へ

ニプロESファーマ株式会社

プラバスタチンNa塩錠「タナベ」は、血液中のコレステロールを減らすおクスリです。

このおクスリは、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起る事が知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

- 筋肉が痛い
- 手足の力がはいらぬ
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

副作用はどんなおクスリにもありますが、早期に発見し、適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。

また、ほかにもおクスリを服用して体調がおかしいと感じられましたら、主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。(裏面につづく)

***横紋筋融解症とは:**

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

製品に関するお問い合わせ先

ニフオ株式会社 医薬品情報室

 **0120-226-898**

受付時間：9時～17時15分(月～金、祝日・弊社休業日を除く)